



شرایط انجام آزمایش UBT چیست؟

بیمار برای انجام این آزمایش می‌بایست موارد زیر را رعایت نماید:

۱. حداقل ۶ ساعت ناشتا باشید.
۲. به مدت چهار هفته هیچ آنتی بیوتیکی مصرف نکرده باشید.
۳. حداقل یک هفته از داروهای بلوک کننده گیرنده‌ی (فاموتیدین، سایمتدین، نیزاتیدین، رانیتیدین و...) و مهار کننده‌ی پمپ پروتون (آمپرازول، آسپیرین، پنتاپرازول و...) استفاده نکرده باشید.



شرایط انجام آزمایش UBT چیست؟

بیمار برای انجام این آزمایش می‌بایست موارد زیر را رعایت نماید:

۱. حداقل ۶ ساعت ناشتا باشید.
۲. به مدت چهار هفته هیچ آنتی بیوتیکی مصرف نکرده باشید.
۳. حداقل یک هفته از داروهای بلوک کننده گیرنده‌ی (فاموتیدین، سایمتدین، نیزاتیدین، رانیتیدین و...) و مهار کننده‌ی پمپ پروتون (آمپرازول، آسپیرین، پنتاپرازول و...) استفاده نکرده باشید.



شرایط انجام آزمایش UBT چیست؟

بیمار برای انجام این آزمایش می‌بایست موارد زیر را رعایت نماید:

۱. حداقل ۶ ساعت ناشتا باشید.
۲. به مدت چهار هفته هیچ آنتی بیوتیکی مصرف نکرده باشید.
۳. حداقل یک هفته از داروهای بلوک کننده گیرنده‌ی (فاموتیدین، سایمتدین، نیزاتیدین، رانیتیدین و...) و مهار کننده‌ی پمپ پروتون (آمپرازول، آسپیرین، پنتاپرازول و...) استفاده نکرده باشید.



شرایط انجام آزمایش UBT چیست؟

بیمار برای انجام این آزمایش می‌بایست موارد زیر را رعایت نماید:

۱. حداقل ۶ ساعت ناشتا باشید.
۲. به مدت چهار هفته هیچ آنتی بیوتیکی مصرف نکرده باشید.
۳. حداقل یک هفته از داروهای بلوک کننده گیرنده‌ی (فاموتیدین، سایمتدین، نیزاتیدین، رانیتیدین و...) و مهار کننده‌ی پمپ پروتون (آمپرازول، آسپیرین، پنتاپرازول و...) استفاده نکرده باشید.



شرایط انجام آزمایش UBT چیست؟

بیمار برای انجام این آزمایش می‌بایست موارد زیر را رعایت نماید:

۱. حداقل ۶ ساعت ناشتا باشید.
۲. به مدت چهار هفته هیچ آنتی بیوتیکی مصرف نکرده باشید.
۳. حداقل یک هفته از داروهای بلوک کننده گیرنده‌ی (فاموتیدین، سایمتدین، نیزاتیدین، رانیتیدین و...) و مهار کننده‌ی پمپ پروتون (آمپرازول، آسپیرین، پنتاپرازول و...) استفاده نکرده باشید.